



벼룩잎벌레, 배추좀나방, 진딧물, 담배나방

품 목 명 | 사이안트라닐리프롤-티아메톡삼 입상수화제
 계 통 | 다이아마이드계 + 네오니코티노이드계 (28+4a)
 포장단위 | 40g, 100g



- 빠르고 지속적인 살충 효과
- 강한 침투이행성으로 해충에 근육과 신경에 작용
- 모판 관주를 통해 초기 저온성 해충부터 후기 나방류까지 사전 방제

적용대상 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
갯개미자리 (세발나물)	목화진딧물	다발생기, 경엽처리	4g	수확 7일 전까지	2회 이내
방울다다기양배추	꽃노랑총채벌레	발생초기, 경엽처리			
배추	무테두리진딧물	정식전 육묘상, 관주처리(5ml/주)	80g	정식기	1회 이내
	배추좀나방				
	벼룩잎벌레				
파(쪽파포함)	파굴파리	유충발생초기 10일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	2회 이내
	파범나방				
고추 (단고추류포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격, 경엽처리	4g	수확 3일 전까지	3회 이내
	담배나방	발생초기 10일간격, 경엽처리			
	목화진딧물	다발생기, 경엽처리			
	복숭아혹진딧물				
오이	아메리카잎굴파리	발생초기 7일간격, 경엽처리			2회 이내

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	육묘상자당 사용량		안전사용기준	
			약량	살포량	시기	횟수
벼	벼물바구미	이앙 1일전, 관주처리	2g	300ml	이앙기	1회
	이화명나방					
	흑명나방					
	먹노린재					