



### 나방, 진딧물

품 목 명 | 사이안트라닐리프롤·피메트로진 입상수화제  
 계 통 | 다이아מיד계+피리딘아조메틴계 (28+9b)  
 포장단위 | 100g

## 진딧물, 나방, 멸구를 안심하고 해결

- 잎 속에 숨어있는 나방과 진딧물을 동시에 방제
- 즉각적인 효과 발현으로 작물의 피해를 최소화
- 저항성 진딧물 살충효과와 우수한 지속효과

### Q & A

- Q. 잎 한쪽에만 약제가 처리되었을 때 다른 잎에도 효과가 있을까?
- A. 상하좌우로 이동하는 피메트로진 성분의 살충작용으로 약액이 묻지않은 잎에 있는 진딧물까지 방제됩니다.

### 적용대상 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준					
				시기	횟수				
배추	배추좀나방	다발생기, 경엽처리	4g	수확 14일 전까지	3회 이내				
	복숭아혹진딧물								
	파밤나방								
무	무테두리진딧물								
	배추좀나방								
	복숭아혹진딧물								
수박 (복수박포함)	목화진딧물	다발생기, 경엽처리	4g	수확 3일 전까지	3회 이내				
	파밤나방								
오이	담배가루이					발생초기 7일간격, 경엽처리	4g	수확 3일 전까지	3회 이내
	오이총채벌레								
	온실가루이								
참외	꽃노랑총채벌레					다발생기, 경엽처리			4g
	담배가루이								
호박 (단호박 포함)	목화진딧물	다발생기, 경엽처리	4g	수확 3일 전까지	3회 이내				
	온실가루이								
	복숭아혹진딧물								
고추 (단고추류 포함)	담배나방	발생초기 10일간격, 경엽처리			4g		수확 3일 전까지	3회 이내	
	목화진딧물	다발생기, 경엽처리							
	복숭아혹진딧물								

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
토마토 (방울토마토 포함)	아메리카잎굴파리	발생초기 7일간격, 경엽처리	4g	수확 3일 전까지	3회 이내
	온실가루이				
가지	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리		수확 7일 전 까지	2회 이내
감귤	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
	조팝나무진딧물	다발생기, 경엽처리			
	굴굴나방	발생초기 10일간격, 경엽처리			
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워포함)	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리		수확 7일 전 까지	2회 이내
복숭아	복숭아순나방	발생초기 7일간격, 경엽처리			
	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리		수확 21일 전까지	
백수오(큰조롱)	박주가리진딧물				
순무	복숭아혹진딧물		수확 14일 전까지		
시금치					
썩갓					
우엉					
유채(잎)					
고추 (단고추류포함)	목화진딧물	정식전 육묘상, 관주처리(3.5ml/주)	100g	정식전까지	
	복숭아혹진딧물				
배추	무테두리진딧물				
상추(양상추포함)	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리	4g	수확 14일 전까지	2회 이내
양배추	배추좀나방	정식전 육묘상, 관주처리(3.5ml/주)	100g	정식전까지	1회 이내
수박(복수박포함)	목화진딧물	발생초기, 근부관주처리(100ml/주)	8g	수확 14일 전까지	2회 이내
토마토 (방울토마토포함)	아메리카잎굴파리		수확 3일 전까지		
호박(단호박포함)	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리		4g	
근대			수확 7일 전까지		
당귀(잎,뿌리)					
돌나물					
들깨(잎)					
아스파라거스					
아욱					
양미나리(셀러리)					
자두	복숭아심식나방	발생초기, 경엽처리	수확 7일 전까지		
케일	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리			
향미나리(파슬리)					