



아크라마이트

응애

품 목 명 | 비페나제이트 액상수화제
 계 통 | 카바제이트계 (20d)
 포장단위 | 330ml

신속하고 안전하게 저항성 점박이응애 해결!

- 각종 응애 유약충 및 성충, 점박이응애에 살란효과
- 포식성 응애에 안전
- 내우성이 우수하며 약흔이 적고 분진이 없어 사용자에게 안전

적용대상 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
감귤	굴응애	한 잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	3회 이내
배	점박이응애			수확 10일 전까지	
사과	응애 (사과응애, 점박이응애)			수확 7일 전까지	
다래	점박이응애	다발생기, 경엽처리		수확 14일 전까지	2회 이내
대추		발생초기, 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
복숭아		한 잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
블루베리		발생초기, 경엽처리		수확 3일 전까지	3회 이내
수박(복수박포함)		한 잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
참외				수확 3일 전까지	3회 이내
착색단고추류				수확 7일 전까지	2회 이내
들깨(잎)		차면지응애	신초 피해발생초기, 경엽처리	수확 3일 전까지	3회 이내
가지		점박이응애	발생초기, 경엽처리	수확 14일 전까지	
차		차응애	한 잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리	-	-
장미	점박이응애	다발생기, 경엽처리	20ml	-	-
국화		발생초, 경엽처리			
수국	차응애	발생초, 경엽처리	10ml	수확 3일 전까지	2회 이내
복분자(라즈베리)	점박이응애	발생초기, 경엽처리		수확 7일 전까지	
블랙베리				수확 3일 전까지	
아로니아					수확 7일 전까지
양미나리(셀러리)					
양앵두(체리)					