



**복숭아순나방, 복숭아심식나방**

품 목 명 | 에마멕틴벤조에이트·루페뉴론 입상수화제  
 계 통 | 항생물질계 + 벤자마이드계 (6+15)  
 포장단위 | 133g, 330g

## 신속하고 긴 지속효과로 저항성 나방도 안심하고 해결

- 침달성이 우수하여 이미 침입한 복숭아순나방에 확실한 살충효과와 뛰어난 신초 보호
- 알+유충에 대한 탁월한 효과 및 긴 약효 지속성
- 저항성 나방을 빠르고 효과적으로 방제

### 적용대상 및 사용량

작물명	적용 해충	사용시기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
사과	복숭아순나방	발생초기 7일간격, 경엽처리	13.3g	수확 14일 전까지	3회 이내
복숭아	복숭아심식나방	발생초 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	
	복숭아굴나방	발생초기 10일간격, 경엽처리			
자두	복숭아순나방	발생초기 7일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	
배추	배추좀나방	다발생기, 경엽처리		수확 7일 전까지	
	파밤나방			수확 2일 전까지	
수박(복수박 포함)	파밤나방	발생초기 10일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	
고추 (단고추류 포함)	담배나방	발생초기, 경엽처리			
	열대거세미나방	발생초기, 경엽처리			
파(쪽파포함)	파밤나방	발생초기 10일간격, 경엽처리			
	열대거세미나방	발생초기, 경엽처리			