원예용 살균제

새나리®

흰가루병, 잿빛곰팡이병

품 목 명 | 아이소피라잠 유제
계 통 | 카복사마이드계 (다2)
포장단위 | 100ml

흰가루 병징이 보이기 시작하면 미리미리 새나리

- 병해충의 침입을 막기 위한 보호벽을 만들기 위해, 잎표면의 왁스층과 결합작용하여 뛰어난 보호효과
- 병원균의 포자가 잎에 부착되어 결착, 에너지를 생성하기 전 효과적으로 포자를 방제
- 타약제에 비해 지속효과가 월등하며 초기에 처방이 가능

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
참외	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리	10ml	수확 3일 전까지	3회 이내
오이				수확 2일 전까지	
수박(복수박포함)				수확 7일 전까지	4회 이내
가지		발생초 10일간격, 경엽처리		수확 3일 전까지	3회 이내
고추(단고추류포함)				수확 2일 전까지	
멜론				수확 14일 전까지	
호박(단호박포함)		발병초 10일간격, 경엽처리		수확 3일 전까지	
토마토(방울토마토 포함)					
팥				수확 14일 전까지	
오미자		발병초 7일간격, 경엽처리			
부추	잎마름병	발병초기 7일간격, 경엽처리			
여주	흰가루병	발병초기 10일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	
딸기	잿빛곰팡이병	발생초 7일간격, 경엽처리		수확 2일 전까지	
	흰가루병				
구기자	흰가루병	발생초기, 경엽처리		수확 7일 전까지	
뽕나무(오디)				수확 14일 전까지	2회 이내
여주	점무늬병			수확 7일 전까지	3회 이내
참깨	흰가루병				
향미나리(파슬리)					2회 이내