



**아타라<sup>®</sup>** 입제

진딧물류, 굼벵이류, 아메리카잎굴파리

품 목 명 | 티아메톡삼 입제  
계 통 | 네오니코티노이드계(4a)  
포장단위 | 1kg(330m<sup>2</sup>용)

## 침투이행성 흡즙해충 종합살충제

- 살충성분이 뿌리를 통해 흡수 이행되며, 진딧물과 굴파리를 효과적으로 방제
- 작물을 심기 전에 처리하면 토양으로부터 작물에 지속적으로 흡수되면서 약효가 오래 지속
- 사용이 편리

### 적용대상 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	1,000m <sup>2</sup> (10a)당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
고추 (단고추류포함) 수박	진딧물 (목화진딧물, 복숭아혹진딧물)	정식전, 토양혼화처리	3kg	정식기	1회 이내
감자	복숭아혹진딧물	파종전, 토양혼화처리			
담배	목화진딧물	정식전, 토양혼화처리			
오이	복숭아혹진딧물	정식전, 토양혼화처리		파종(정식)기	
옥수수	보리수염진딧물	파종전, 토양처리		수확 70일 전까지	
인삼	굼벵이류	유충 부화기, 토양전면처리		정식기	
참외	목화진딧물	정식전, 두둑처리			
토마토 (방울토마토포함)	아메리카잎굴파리	발생초, 작물주변 토양처리	1g/주	수확 2일 전까지	2회 이내
갯 고추(잎)	복숭아혹진딧물	정식전, 토양혼화처리	3kg	파종(정식)기	1회 이내
	목화진딧물	정식(파종)전, 토양혼화처리		파종기	