



아스타릭®

응애, 굴나방, 잎굴파리

품 목 명 | 아바멕틴 액제

계 통 | 항생물질계

포장단위 | 200ml

응애여왕 돌아왔다 출시 첫 해 아바멕틴 단제(유제) 시장 점유율 29% 석권

- 사용에 불편한 냄새가 없고 과실에 약흔이 남지 않음
- 아바멕틴 유제보다 3배 높은 유효성분 활용으로
최고의 살비효과 제공
- 동녹과 근접살포 약해로부터 더 안전

적용대상 및 사용량

작물명	적용 해충	사용시기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
감귤	굴굴나방	발생초기 10일간격, 경엽처리	6.7ml	수확 14일전까지 사용	3회 이내
	파리류	발생초기, 경엽처리			
고추 (단고추류포함)	차면지응애	신초피해 발생초기, 경엽처리		수확 2일 전까지 사용	
배	점박이응애	발생초기, 경엽처리		수확 7일 전까지 사용	2회 이내
사과	사과응애				
	점박이응애				
수박(복수박포함)					
오이	아메리카잎굴파리	발생초기 7일간격, 경엽처리	수확 2일 전까지 사용		
참외			수확 7일 전까지 사용		