원예용 살균제

아미스타®

과수 및 특용작물 전문농업인을 위한 광범위 종합살균제

겹무늬썩음병, 갈색무늬병, 점무늬낙엽병, 역병, 탄저병

품 목 명 | 아족시스트로빈 수화제
계 통 | 스트로빌루린계 (다3)
포장단위 | 250g

- 스트로빌루린 계통으로 넓은 스펙트럼
- 예방효과와 치료효과를 겸비하여 병 발생 전, 발생 직후에 사용이 가능
- 침달성, 빠른 침투이행성으로 내우성이 우수
- 환경 및 유익충에 안전

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
배	검은별무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	20g	수확 7일 전까지	5회 이내
	역병				
사과	겹무늬썩음병	6월중순부터 10일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	
	갈색무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리			
	점무늬낙엽병				
	역병				
	탄저병	6월상순부터 10일간격, 경엽처리			
포도	노균병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	
	갈색무늬병				
	새눈무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리			
	탄저병	발병초 10일간격, 경엽처리			
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내
감귤	더뎅이병	춘지발생초 15일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	5회 이내
인삼	점무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리			4회 이내
감(단감포함)	둥근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	5회 이내
	모무늬낙엽병	6월 중순부터 10일간격, 경엽처리			
머루	새눈무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리			3회 이내
복분자	탄저병		10g	수확 2일 전까지	

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
미나리	갈색무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	20g	수확 7일 전까지	2회 이내
천궁(일천궁)	흰가루병	발생초기 10일간격, 경엽처리	10g	수확 21일 전까지	
벼	잎도열병	발병초, 경엽처리	20g		3회 이내
	목도열병	출수 7일전, 경엽처리			
	잎집무늬마름병	유수형성기, 수잉기, 경엽처리			
	세균벼알마름병	출수직전부터 7일간격, 경엽처리			
	흰잎마름병	발병직전 7일간격, 경엽처리			
당귀(뿌리)	점무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	
감초	갈색점무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 21일 전까지	
황기	노균병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	
도라지	점무늬병			수확 7일 전까지	
마(산약)				수확 21일 전까지	
석류	열매썩음병			수확 14일 전까지	
	탄저병				
양앵두(체리)	잿빛무늬병				4회 이내
참다래(키위)	균핵병				3회 이내
비름	흰녹가루병			수확 7일 전까지	2회 이내
국화	흰녹병	발병초 7일간격, 경엽처리		-	-
장미	검은무늬병				
블루베리	역병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
갯기름나물(방풍)	탄저병	발생초기, 경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내
고려엉겅퀴(곤드레나물)				수확 7일 전까지	2회 이내