벤레이트

탄저병, 검은별무늬병, 더뎅이병

품 목 명 | 베노밀 수화제
계 통 | 벤지미다졸계 (1A)
포장단위 | 200g, 330g

예방과 치료효과의 광범위 종합살균제

- 예방 및 치료효과가 우수
- 작물 및 여러 병해에 대한 적용범위가 넓어 사용이 편리하고 수확전 사용으로 저장 운송 중에 발생할 수 있는 저장 병해 예방
- 침투이행성으로 뛰어난 약효발현

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	1,000m²(10a)당 사용량		안전사용기준	
				약량	살포량	시기	횟수
사과	겹무늬썩음병	6월하순부터 9월상순까지 10일간격, 경엽처리	13g	약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림		수확 10일 전까지	3회 이내
	탄저병	6월상순부터 9월중순 10일간격, 경엽처리					
	흰날개무늬병	묘목 정식후, 토양관주처리		40ℓ/근권면적 m²			
배	검은별무늬병	5~6월과 10월경에 10일간격, 경엽처리	10g	약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림		수확 14일 전까지	4회 이내
	흰가루병	꽃이 피기 전과 꽃이 진 후 10일경부터 10일간격, 경엽처리	13g				
포도	새눈무늬병	발병초부터 10일간격, 경엽처리				수확 7일 전까지	2회 이내
	탄저병						
감귤	더뎅이병						4회 이내
감(단감포함)	둥근무늬낙엽병	6월상순부터 10일간격, 경엽처리				수확 21일 전까지	5회 이내
유자	더뎅이병	발병초(신초신장기)부터 10일간격, 경엽처리				수확 14일 전까지	4회 이내
수박	탄저병	발병초부터 7~10일간격, 경엽처리	10g			수확 2일 전까지	5회 이내
	덩굴마름병	발병직전 또는 발병초부터 10일간격, 경엽처리	13g				
참깨	잎마름병	발병초부터 10일간격, 경엽처리				수확 14일 전까지	4회 이내
땅콩	검은무늬병					수확 7일 전까지	
	갈색무늬병						
상추	균핵병	발병초기부터 10일간격, 경엽처리				수확 3일 전까지	2회 이내
호박	검은별무늬병	발병초부터 7일간격, 경엽처리				수확 7일 전까지	3회 이내
느타리버섯	푸른곰팡이병	배지 살균전, 처리	20g	희석액 6L/배지평당		종균접종전	1회 이내
부추	잿빛곰팡이병	예취 5~7일 후, 경엽처리	10g	약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림		수확 7일 전까지	2회 이내
고추	탄저병	발병초부터 10일간격, 경엽처리	13g			수확 2일 전까지	4회 이내
참다래(키위)	과실연부병	6월상순부터 10일간격, 경엽처리				수확 21일 전까지	3회 이내
구기자	탄저병	발병초기 7일간격, 경엽처리	10g			수확 14일 전까지	2회 이내
마							
무화과	줄기마름병	적심 직후, 경엽처리	13g			수확 7일 전까지	
쑥갓	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격, 경엽처리	20g				
알로에	탄저병	발생초기, 경엽처리	10g				3회 이내
잇꽃(홍화)		발병초기 7일간격, 경엽처리					2회 이내
차나무		발생초기, 경엽처리				수확 30일 전 까지	3회 이내