



**진딧물, 온실가루이, 멸구**

품 목 명 | 피메트로진 입상수화제  
 계 통 | 피리딘아조메틴계 (9b)  
 포장단위 | 40g, 100g

## 저항성 진딧물, 벼멸구에도 효과적인 해결책

- 독특한 살충작용으로 저항성 진딧물 해결
- 신초나 잎 뒷면에 숨어있는 진딧물, 벼멸구도 해결
- 살포 3일 후 수정벌 방사 안전



### 적용대상 및 사용량 (수도용)

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	1,000m <sup>2</sup> (10a)당 사용량		물 20L 당 사용량	안전사용기준	
			약량	살포량		시기	횟수
벼	벼멸구	다발생기, 경엽처리	28~32g	140~160L	4g	수확 14일 전까지	3회 이내
보리	애멸구		약액이 충분히 묻도록 골고루			수확 21일 전까지	

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	육묘상자당 사용량		안전사용기준	
			약량	살포량	시기	횟수
벼	벼멸구	이앙·일전육묘상, 관주처리	4g	300ml	이앙기	1회 이내



### 적용대상 및 사용량 (원예용)

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
가지	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리	4g	수확 7일 전까지	2회 이내
고추(단고추류포함)	목화진딧물			수확 3일 전까지	3회 이내
	복숭아혹진딧물			수확 21일 전까지	1회 이내
근대	복숭아혹진딧물			수확 7일 전까지	2회 이내
기장	옥수수테두리진딧물			수확 14일 전까지	
귀리	기장테두리진딧물			수확 3일 전까지	
녹색꽃양배추(브로코리)	무테두리진딧물			수확 14일 전까지	
	복숭아혹진딧물			수확 14일 전까지	
단호박	목화진딧물			수확 7일 전까지	1회 이내
당근	복숭아혹진딧물			수확 7일 전까지	
도라지	사삼수염진딧물	수확 7일 전까지			
들깨(잎)	복숭아혹진딧물				

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준				
				시기	횟수			
딸기	목화진딧물	다발생기, 경엽처리	4g	수확 2일 전까지	3회 이내			
매실	복숭아혹진딧물			수확 21일 전까지	2회 이내			
머위				무테두리진딧물	수확 14일 전 까지	1회 이내		
무	복숭아혹진딧물					2회 이내		
미나리	꼬부랑진딧물			수확 21일 전까지	3회 이내			
방울다다기양배추	복숭아혹진딧물					수확 14일 전까지	2회 이내	
배추	무테두리진딧물			수확 5일 전 까지	3회 이내			
	복숭아혹진딧물							
백수오(큰조롱)	박주가리진딧물			수확 14일 전까지	2회 이내			
상추	복숭아혹진딧물							
수박(복수박포함)	목화진딧물			수확 14일 전까지	3회 이내			
울무	미국선녀벌레			다발생기, 경엽처리	4g	수확 7일 전까지	2회 이내	
토란	복숭아혹진딧물							
순무	무테두리진딧물							
순무양배추(콜라비)	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리	수확 14일 전까지					1회 이내
시금치								
썩갓								
아스파라거스								
아욱								
양배추	무테두리진딧물	수확 21일 전까지	1회 이내					
	복숭아혹진딧물							2회 이내
여주	목화진딧물	수확 7일 전까지	3회 이내					
오이	온실가루이	발생초기 7일간격, 경엽처리		수확 3일 전까지				
우엉	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리	4g	수확 7일 전까지	2회 이내			
유채	무테두리진딧물							
유채(잎)	복숭아혹진딧물					수확 14일 전까지		
자두								
청경채	무테두리진딧물					수확 7일 전까지		
호박	복숭아혹진딧물					수확 7일 전까지		
갯기름나물(방풍)	목화진딧물							
고려엉겅퀴(곤드레나물)	싸리수염진딧물							
고수	아카시아진딧물					발생초기, 경엽처리		

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
다채(비타민)	복숭아혹진딧물	다발생기, 경엽처리	4g	수확 7일 전까지	2회 이내
당귀(잎,뿌리)				수확 21일 전까지	
대추				수확 7일 전까지	
돌나물				수확 21일 전까지	3회 이내
망고					
보리	애멸구			수확 21일 전까지	3회 이내
살구	복숭아혹진딧물				
양미나리(셀러리)	파혹진딧물			수확 7일 전까지	2회 이내
쪽파	무테두리진딧물				
케일	복숭아혹진딧물				
	파				
향미나리(파슬리)	목화진딧물				
	복숭아혹진딧물				

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	1,000m <sup>2</sup> (10a)당 사용량		물 20L 당 사용량	안전사용기준	
			약량	살포량		시기	횟수
배추	무테두리진딧물 (무인항공기)	다발생기, 경엽처리	29g	1.6L	362.5g	수확 14일 전까지	2회 이내