



검은별무늬병, 둥근무늬낙엽병, 탄저병

품 목 명 | 아족시스트로빈 · 디페노코나졸 액상수화제
 계 통 | 스트로빌루린계 + 트리azole계 (다3+사1)
 포장단위 | 100ml

예방과 치료 효과를 겸비한 과수 병해 방제의 해결책!

- 뛰어난 병원균 침입 예방효과 및 치료효과
- 우수한 지속성으로 잦은 강우에도 안심
- EBI 저항성 병원균에도 안정적
- 배 낙화직후에도 사용 가능

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
배	검은별무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	4ml	수확 7일 전까지	3회 이내
	붉은별무늬병				
감(단감 포함)	둥근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격, 경엽처리	5ml	수확 7일 전까지	
	탄저병	6월 중순부터 10일간격, 경엽처리			
복숭아	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리	4ml	수확 14일 전까지	
	검은점무늬병	발병 직전 10일간격, 경엽처리			
	탄저병				
감귤	잿빛무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리	5ml	수확 30일 전까지	
자두	더덩이병	춘지발생초 15일간격, 경엽처리			
오이	잿빛무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리	5ml	수확 7일 전까지	
참외	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리			
포도	갈색무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	5ml	수확 3일 전까지	3회 이내
	탄저병				
인삼	점무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	4ml	수확 14일 전까지	4회 이내
매실	탄저병	4월 중순부터 10일간격, 경엽처리			
딸기	검은별무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리	4ml	수확 2일 전까지	3회 이내
마늘	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리	4ml	수확 7일 전까지	
	녹병				
대추	앞마름병	발병초 10일간격, 경엽처리	4ml	수확 7일 전까지	4회 이내
	녹병				
머루	갈색무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	5ml	수확 14일 전까지	3회 이내
	탄저병				
마(산약)	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리	4ml	수확 21일 전까지	4회 이내
	과실무름병				
참다래(키위)	과실무름병	6월 상순부터 10일간격, 경엽처리	4ml	수확 14일 전까지	2회 이내
들깨(잎)	녹병	발병초 7일간격, 경엽처리			
장미	흰가루병	발병초 7일간격, 경엽처리	5ml	-	-
철쭉	갈색무늬병	발병초기 10일간격, 경엽처리	20ml		
벼	목도열병	출수 7일전까지, 경엽처리	8ml	수확 21일 전까지	3회 이내
	잎집무늬마름병	유수형성기 및 수잉기, 경엽처리			
콩	탄저병(무인항공기)	발생초기 10일간격, 경엽처리	50ml/10a	수확 14일 전까지	3회 이내