원예용 살균제

아로빈®

탄저병, 갈색무늬병, 겹무늬썩음병

품 목 명 | 아시벤졸라-에스-메틸·디티아논 액상수화제
계 통 | 벤조티아디아졸계 + 퀴논계 (차1+카)
포장단위 | 500ml

면역활성물질을 함유한 탄저병, 갈색무늬병 전문살균제

- 우수한 약효 지속성으로 안정적인 병 방제효과
- 기존 약제에 대한 저항성 병원균에도 뛰어난 효과
- 탄저병과 갈색무늬병에 대한 탁월한 방제효과로 사과를 깨끗하게 수확할 수 있도록 도움

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
사과	탄저병	6월 상순부터 10일간격, 경엽처리	20ml	수확 21일 전까지	4회 이내
	겹무늬썩음병				
	갈색무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리			
	점무늬낙엽병	발생초 10일간격, 경엽처리			
복숭아	세균구멍병	발병직전 10일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
	잎오갈병	발아직전 및 꽃피기직전 각 1회, 경엽처리			
감귤	검은점무늬병	6월상순부터 2주간격, 경엽처리			4회 이내
	더뎅이병	춘지발생초 15일간격, 경엽처리			
고추 (단고추류포함)	세균점무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
	탄저병	발병초 10일간격, 경엽처리			
감(단감포함)		6월상순부터 10일간격, 경엽처리		수확 30일 전까지	3회 이내