원예용 살균제

보가드®

갈색무늬병, 겹무늬썩음병, 점무늬낙엽병, 흰가루병

품 목 명 | 디페노코나졸 입상수화제

계 통 | 트리아졸계 (사1)

포장단위 | 250g

예방 및 치료효과가 뛰어난 트리아졸계 대표 살균제

- 예방 및 치료효과가 뛰어남
- 적용작물이 다양하고 주요 병해의 동시 방제로 경제적
- 약제 처리 후 작물의 체내로 신속한 흡수 및 이행이 이루어짐

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
배	붉은별무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리	10g	수확 14일 전까지	5회 이내
	검은별무늬병				
감(단감포함)	둥근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격, 경엽처리			3회 이내
	탄저병				
	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리			
사과	갈색무늬병				5회 이내
	겹무늬썩음병	6월 중순부터 10일간격, 경엽처리			
	점무늬낙엽병	발병초 10일간격, 경엽처리			
포도	탄저병			수확 7일 전까지	3회 이내
	갈색무늬병				
	새눈무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리			
인삼	점무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 40일 전까지	3회 이내
수박	덩굴마름병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	4회 이내
감귤	더뎅이병	춘지발생초 15일간격, 경엽처리		수확 21일 전까지	5회 이내
오이	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 2일 전까지	3회 이내
	검은별무늬병				
딸기	흰가루병	발병초 7일간격, 경엽처리			
	탄저병				
복숭아	잿빛무늬병			수확 14일 전까지	
당근	검은잎마름병	발병초 20일간격, 경엽처리		수확 10일 전까지	
땅콩	잎마름병	발생초기, 경엽처리		수확 30일 전까지	
마늘	녹병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	
지황	점무늬병	발병초부터 10일간격, 경엽처리		수확 40일 전까지	
산수유	탄저병	발병초 10일간격, 경엽 및 과실처리		수확 30일 전까지	
취나물	녹병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
양앵두(체리)	갈색무늬병	발생초 10일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	4회 이내
열무	검은무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리			2회 이내
백수오(큰조롱)	점무늬낙엽병	발병초 10일간격, 경엽처리			3회 이내