



큐어균

**무름병, 세균점무늬병,
세균구멍병 외**

품 목 명 | 옥솔린산수화제

계 통 | 퀴리논계

포장단위 | 200g, 500g

침투이행성이 뛰어나고 안전한 세균병 전문약제

- 타항생제에 내성이 생긴 병원균에도 우수한 약효
- 침투이행성 및 잔효성 우수
- 배추 무름병 방제 등 세균병 방제에 탁월한 효과
- 약해에 타항생제보다 안정적

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
감초	세균점무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리	20g	수확 14일 전까지	3회 이내
갓	무름병	발병직전부터 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	
강활	퀘양병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 30일 전까지	
고추 (단고추류포함)	세균점무늬병	발병초부터 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
근대	무름병	발병초 7일간격, 수간처리		수확 14일 전까지	
기장	세균줄무늬병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
냉이	무름병	발병초, 경엽처리		수확 14일 전까지	
녹색꽃양배추 (브로콜리)		발병초 7일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	
당근	세균열매썩음병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내
대추	검은썩음병	발병초 10일간격, 경엽처리			
방울다다기양배추	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 3일 전까지	5회 이내
배추	세균구멍병	발병초기부터 7일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	
복숭아	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
부추				수확 14일 전까지	
비름	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
비트				수확 14일 전까지	
산마늘	세균썩음병	발병초기 7일간격, 경엽처리		수확 30일 전까지	3회 이내
삼주	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	
상추(양상추포함)	과일썩음병	발병 초기부터 7일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
수박	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	
순무양배추 (콜라비)				수확 7일 전까지	
쌈추	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 3일 전까지	3회 이내
썩갓				수확 7일 전까지	
아스파라거스	무름병	발병초기, 경엽처리		수확 3일 전까지	3회 이내
양배추	검은썩음병	발병초, 경엽처리		수확 14일 전까지	
	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리			
양행두(체리)	세균구멍병	만개기 10일 후부터, 경엽처리	수확 7일 전까지	3회 이내	
청경채	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리	수확 14일 전까지		
콩(태광)	들불병	발병초 10일간격, 경엽처리	수확 14일 전까지	1회 이내	
	세균점무늬병				
파(쪽파포함)	무름병	발병초 7일간격, 경엽처리	수확 7일 전까지	4회 이내	
마늘					