원예용 살균제

오티바옵티®

탄저병, 흰가루병, 역병, 갈색점무늬병

품 목 명 | 아족시스트로빈·클로로탈로닐 액상수화제
계 통 | 스트로빌루린계 + 유기염소계 (다3+카)
포장단위 | 170ml

예방과 치료효과가 우수한 광범위 종합살균제

- 예방 및 치료효과를 겸비하여 처리 적기 폭이 넓음
- 스트로빌루린 계통에 저항성을 보이는 흰가루병, 노균병에도 효과가 탁월
- 액상수화제로 작물에 약흔이 남지 않으며, 광범위 종합살균제로 대부분의 채소 병해에 적용 가능

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
고추 (단고추류포함)	탄저병	발병초 10일간격, 경엽처리	13.3ml	수확 3일 전까지	3회 이내
	흰가루병				
	역병	장마직전부터 10일간격, 경엽처리			
	갈색점무늬병	발병초 10일간격, 경엽처리			
오이	노균병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 2일 전까지	
	검은별무늬병				
	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리			
	갈색무늬병				
감자	역병			수확 10일 전까지	4회 이내
수박 (복수박포함)	덩굴마름병	발병초 7일간격, 경엽처리		수확 5일 전까지	3회 이내
	역병				
	흰가루병	발병초 10일간격, 경엽처리			
	탄저병	발병초기 10일간격, 경엽처리			
참외	노균병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 2일 전까지	
	흰가루병				
마늘	잎마름병	발병초기 10일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	
	녹병	발병초 10일간격, 경엽처리			
인삼	점무늬병			수확 14일 전까지	
	탄저병				