원예용 살균제

플레이®

붉은곰팡이병, 깜부기병, 흑색썩음균핵병

품 목 명 | 디페노코나졸·프로피코나졸 유제

계 통 | 트리아졸계 + 트리아졸계 (사1+사1)

포장단위 | 500ml

강한 침투력과 지속력을 겸비한 종합살균제

- 강력한 침투력과 지속력으로 예방 및 치료효과
- 밀, 보리 붉은곰팡이병 등록 : 출수 전·후로 2회 방제 추천

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	희석배수 (10a당 사용약량)	안전사용기준	
				시기	횟수
양파	흑색썩음균핵병	정식 전, 토양분무처리	40ml(100L/10a)	정식기	1회 이내
마늘		파종 전, 종구침지처리 (30분)	40ml	파종기	
파(쪽파포함)		정식 전, 토양분무처리	40m(100L/10a)	정식기	
고추 (단고추류포함)	흰비단병	발병초 7일간격, 토양관주처리	10ml(100ml/주)	수확 7일 전까지	2회 이내
밀	붉은곰팡이병	출수기 및 출수 10일후, 경엽처리	10ml	수확 30일 전까지	
보리		출수기 10일간격, 경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내
	흰가루병	발병초 7일간격, 경엽처리			
수수	이삭곰팡이병	개화기부터 7일간격, 경엽처리		수확 30일 전까지	
옥수수	깜부기병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	
	깨씨무늬병	발생초 10일간격, 경엽처리			