원 예 용 살 균 제

# 픽데이

## 탄저병, 잿빛곰팡이병, 갈색무늬병, 점무늬병

**품 목 명** | 플루아지남 액상수화제

**계　　통** | 디니트로아니린계 (다5)

**포장단위** | 100ml, 250ml

## 탄저병, 곰팡이병 등 예방부터 강력하게, 픽! 픽데이!

- 다양한 병해를 동시에 방제하는 우수한 약제
- 비가 와도 잘 씻기지 않아 안정적인 약효 발현
- 긴 잔효력으로 뛰어난 지속성
- 저항성 발생우려가 적어 방제력 활용에 우수

### 적용대상 및 사용량

| 작물명 | 적용 병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L 당 사용량 | 안전사용기준 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 시기 | 횟수 |
| 감귤 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | 10ml | 수확 30일 전까지 | 3회이내 |
| 감자 | 역병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | | 수확 14일 전까지 | |
| 고추 (단고추류포함) | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 복숭아 | | | | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 |
| 배추 | 뿌리혹병 | 정식전, 토양분무처리(100ml/㎡) | 100ml | 정식기 | 1회 이내 |
| 사과 | 탄저병 | 6월 상순부터 10일간격, 경엽처리 | 10ml | 수확 21일 전까지 | 3회 이내 |
| | 갈색무늬병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | | | |
| 아스파라거스 | 검은무늬병 | 발병초 7일간격, 경엽처리 | 8ml | 수확 7일 전까지 | 2회 이내 |
| 옥수수 | 깜부기병 | 출수직전, 경엽처리 | | | 3회 이내 |
| 우엉 | 탄저병 | 발병초 10일간격, 경엽처리 | | | 2회 이내 |
| 인삼 | 점무늬병 | | 10ml | 수확 14일 전까지 | 4회 이내 |
| 자두 | | 발병초 7일간격, 경엽처리 | | | 3회 이내 |