





## 역병, 노균병, 탄저병

품 목 명 | 클로로탈로닐 메탈락실 -엠 액상수화제

계 통 | 유기염소계 + 아실아라닌계 (카+가1)

**포장단위** | 100ml, 500ml

## 역병, 노균병, 탄저병 방제 전문살균제

- 작물체 내/외의 이중보호(치료)효과의 살균제
- 역병, 노균병에 우수한 효과를 보이는 전문살균제

## 적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
고추 (단고추류 포함)	역병	장마직전부터 10일간격, 경엽처리	20ml	수확 3일 전까지	3회 이내
	탄저병	발병초 10일간격, 경엽처리			
감자	역병			수확 10일 전까지	4회 이내
토마토 (방울토마토 포함)		발병초 7일간격, 경엽처리		수확 5일 전까지	3회이내
인삼		발병초 10일간격, 경엽처리		수확 21일 전까지	
참깨		발병직전부터 10일간격, 경엽처리		수확 14일 전까지	4회 이내
배추	노균병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
양파		발병초 7일간격, 경엽처리			4회 이내
오이				수확 2일 전까지	3회 이내

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20L 당 사용량	1,000m²(10a)당 사용량 약량 살포량	
배추	노균병(무인항공기)	발병초 10일간격, 경엽처리	1667ml	133ml	1.6L