



역병, 노균병

품 목 명 | 만디프로파미드 액상수화제

계 통 | 카르복실릭에시드아미드계 (A5)

포장단위 | 100ml, 500ml

장마철에 더 강한 역병, 노균병 살균제

- 보호효과가 오랫동안 지속되어 장마철에도
채소역병, 노균병을 확실하게 해결
- 수량, 품질 향상 및 잔류에도 안전
- 월등한 예방과 방제효과

적용대상 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20L 당 사용량	안전사용기준	
				시기	횟수
감자	역병	발병초 10일간격, 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	4회 이내
갯	노균병	발생초기, 경엽처리			수확 21일 전까지
대추	역병			수확 7일 전까지	
망고	역병				수확 14일 전까지
부추	노균병			수확 2일 전까지	
유자	역병	발병초 10일간격, 경엽처리		수확 7일 전까지	4회 이내
인삼		발병초 7일간격, 경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내
토마토(방울토마토포함)				수확 5일 전까지	4회 이내
수박(복수박포함)				수확 21일 전까지	3회 이내
가지					
참깨		발병초 10일간격, 경엽처리		수확 3일 전까지	3회 이내
삼주		발병초 7일간격, 관주처리(150ml/주)			
딸기		장마직전부터 10일간격, 경엽처리	10ml	수확 7일 전까지	2회 이내
고추(단고추류포함)		발병초 15일간격, 경엽처리			
배추	발병초 10일간격, 경엽처리				
포도	노균병	발병초 10일간격, 경엽처리	수확 21일 전까지	3회 이내	
참외		수확 3일 전까지			
시금치					
들깨(잎)			6.7ml	수확 5일 전까지	2회 이내
상추(양상추포함)		10ml			
녹색꽃양배추(브로콜리)		6.7ml			
양배추	역병	발병초 10일간격, 경엽처리	수확 7일 전까지	3회 이내	
큰조롱(백수오)		발병초기 7일간격, 경엽처리			
파(쪽파포함)		발생초기, 경엽처리			
		발병초 7일간격, 경엽처리	10ml	수확 21일 전까지	