



## 확실하고 신속한 효과로 나방, 노린재, 갈색날개매미충 해결

**복숭아순나방, 사과굴나방,  
톱다리개미허리노린재**

품 목 명 | 클로란트라닐리프롤 램다사이할로트린 액상수화제

계 통 | 다이아마이드계 + 합성피레스로이드계 (28+3a)

포장단위 | 62.5ml

- 탁월한 노린재 방제로, 고품질 과일 생산에 도움
- 효과적인 저항성 나방 관리

### 적용대상 및 사용량

작물명	적용 해충	사용시기 및 방법	물 20L 당 사용량	1,000m <sup>2</sup> (10a)당 사용량		안전사용기준	
				약량	살포량	시기	횟수
사과	사과굴나방	발생초기 10일간격, 경엽처리	2.5ml	-	-	수확 14일 전까지	3회 이내
	톱다리개미허리노린재						
배	복숭아순나방	발생초기 7일간격, 경엽처리					
	감(단감포함)	감꼭지나방				발생초기 10일간격, 경엽처리	
톱다리개미허리노린재		수확 21일 전까지					
복숭아	갈색날개매미충	다발생기, 경엽처리					
	복숭아굴나방	발생초기 10일간격, 경엽처리				수확 7일 전까지	
감귤	복숭아순나방	발생초기 7일간격, 경엽처리					
	잎말이나방	다발생기, 경엽처리					
고추 (단고추류포함)	담배나방	발생초기 10일간격, 경엽처리				-	
	열대거세미나방	발생초기, 경엽처리	드론 3.2L				
배추	배추좀나방	다발생기, 경엽처리	-	16ml	무인헬기 1.6L	수확 14일 전까지	
	자두	썩덩나무노린재					발생초 7일간격, 경엽처리
복숭아순나방							
콩	톱다리개미허리노린재 (무인항공기)	발생초기 10일간격, 경엽처리	-	16ml	무인헬기 1.6L	수확 14일 전까지	
	콩나방(무인항공)						드론 3.2L